



FEDERAZIONE
CENTRI PER LA DIAGNOSI
DELLA TROMBOSI E LA
SORVEGLIANZA DELLE TERAPIE
ANTITROMBOTICHE (FCSA)

VACCINAZIONE ANTI COVID-19

FCSA RACCOMANDA



1

DEVO FARE IL VACCINO?

La vaccinazione contro il COVID-19 è **RACCOMANDATA** per tutti i pazienti in trattamento anticoagulante. Tutti i vaccini attualmente disponibili sono efficaci e sicuri, il tipo di vaccino per ogni singolo individuo viene scelto dalle autorità preposte alla vaccinazione sulla base delle evidenze scientifiche.

2

COME DEVE ESSERE L'INIEZIONE?

L'iniezione deve essere fatta intramuscolo anche nel paziente anticoagulato. Si raccomanda di mantenere una pressione nel punto di iniezione per qualche minuto.

3

COSA FARE SE SI ASSUME UN FARMACO ANTIVITAMINA K (COUMADIN®, SINTROM®)?

Si consiglia di effettuare un controllo INR nei giorni precedenti la vaccinazione e di procedere se $INR < 3,0$. Qualora il valore fosse più alto si potrà omettere una dose o dimezzare la dose del giorno precedente la vaccinazione.

4

COSA FARE SE SI ASSUME UN FARMACO DOAC (ELIQUIS®, PRADAXA®, LIXIANA®, XARELTO®) O UN'EPARINA?

Se la vaccinazione avviene al mattino, assumere la dose dopo la vaccinazione, anche se si tratta di spostare di qualche ora l'orario abituale. Questo serve ad evitare che l'iniezione venga effettuata nel momento di massima attività del farmaco, che corrisponde a circa 2 ore dopo l'assunzione.

5

COSA FARE SE SI ASSUME UN FARMACO ANTIAGGREGANTE?

Nel paziente in trattamento con aspirina, clopidogrel, prasugrel o ticagrelor non è necessario modificare l'assunzione abituale.